

Opella.

Health.
In your hands.

For Opella use only

Plant PM code10055639

UpdateV02 - 21-11-2025

2nd Plant PM code10055639

Old PM code—

GMID950077

Item typeLeaflet - Front

Product nameDulcoSoft GO

oral susp in stick

CountryItalia

Plant / CMO—

Technical Data

Format125 x 210 mm

Data matrix—

Colours1

Black

Fonts: Helvetica Condensed regular / bold

Minimum font size9 pt

Assembly Card—

Layout of Cutting—

Technical Card—

Technical Constraint—

Approvals

Impianto di proprietà Opella - Vietata la manomissione

cod. 37668 | | gdp.it

DulcoSoft®GO

Macrogol 4000 - Soluzione orale pronta da bere
Gusto limone - Agisce entro 24-72 ore
Senza zucchero, senza glutine, senza lattosio

CONFEZIONI

DulcoSoft®GO è disponibile nelle seguenti confezioni: 20 bustine monodose da 20 ml

Cosa c'è da sapere su DulcoSoft®GO

Legga attentamente il presente foglietto illustrativo, poiché contiene informazioni importanti di cui deve tenere conto prima di utilizzare questo prodotto. Se ha ulteriori domande o dubbi, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

DulcoSoft®GO è un dispositivo medico indicato per il trattamento sintomatico della stitichezza e per ammorbidire le feci dure. Conservare questo foglietto illustrativo. Potrebbe essere utile rileggerlo.

In questo foglietto illustrativo:

- 1. Cos'è DulcoSoft®GO e a cosa serve?
- 2. Prima di assumere DulcoSoft®GO
- 3. Come assumere DulcoSoft®GO
- 4. Possibili effetti collaterali
- 5. Come conservare DulcoSoft®GO
- 6. Ulteriori informazioni

1. Che cos'è DulcoSoft®GO e a cosa serve?

L'ingrediente principale di DulcoSoft®GO è il macrogol 4000, un lassativo osmotico. Il macrogol 4000 ha un'elevata capacità di legare l'acqua. Trattiene l'acqua utilizzata per l'assunzione e determina un aumento della sua quantità nel colon. In questo modo, le feci dure si ammorbidiscono e il transito intestinale viene facilitato. Questo porta a un aumento dei movimenti intestinali e a una più facile evacuazione, per una sensazione di sollievo naturale, efficace e delicata, da stitichezza e irregolarità. Macrogol 4000 ha una modalità d'azione puramente fisica: non viene praticamente assorbito dall'organismo e viene escreto immutato.

DulcoSoft®GO soluzione orale è indicato per:

- Trattamento sintomatico della stitichezza
- Ammorbidire le feci dure

2. Prima di assumere DulcoSoft®GO

Non utilizzare DulcoSoft®GO in caso di:

- Ipersensibilità nota a uno o più componenti (si veda composizione)
- Ileo paralitico
- Perforazione, ostruzione o stenosi dell'intestino
- Gravi malattie infiammatorie intestinali (ad esempio, colite ulcerosa, morbo di Crohn, megacolon tossico).

L'uso di lassativi è controindicato in caso di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in presenza di grave disidratazione.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Gravidanza e allattamento

DulcoSoft®GO può essere assunto durante la gravidanza o l'allattamento. Si raccomanda comunque di consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento.

Uso nei bambini

La somministrazione nei bambini deve avvenire sotto la diretta supervisione di un adulto.

Uso nei diabetici

Adatto ai diabetici in quanto il prodotto non contiene zucchero.

Utilizzare in caso di dieta povera di sodio

Adatto a pazienti con una dieta a basso contenuto di sodio.

Assunzione di DulcoSoft®GO con altri prodotti

Il prodotto può ridurre il tempo di transito intestinale e quindi ridurre l'assorbimento dei farmaci somministrati per via orale. Consultare il medico in caso di assunzione di medicinali per uso orale, che devono comunque essere somministrati a distanza di almeno 2 ore.



Opella.

Health.

In your hands.

For Opella use only

Plant PM code

10055639

Update

V02 - 21-11-2025

2nd Plant PM code

10055639

Old PM code

—

GMID

950077

Item type

Leaflet - Back

Product name

DulcoSoft GO

oral susp in stick

Country

Italia

Plant / CMO

—

Technical Data

Format

125 x 210 mm

Data matrix

—

Colours

1

Black

Fonts: Helvetica Condensed regular / bold

Minimum font size

9 pt

Assembly Card

—

Layout of Cutting

—

Technical Card

—

Technical Constraint

—

Approvals

Impianto di proprietà Opella - Vietata la manomissione

cod. 37668 | | gdp.it

Il prodotto può provocare un potenziale effetto interattivo se utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. L'ingrediente Macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo efficacemente i preparati che devono rimanere densi per le persone con problemi di deglutizione.

3. Come assumere DulcoSoft®GO

Prenda sempre DulcoSoft®GO esattamente come descritto in questo foglietto illustrativo. Se non è sicuro, consulti il medico o il farmacista.

Indicato per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni
- da 1 a 4 bustine al giorno

La soluzione DulcoSoft®GO è con aroma limone e può essere assunta con acqua o altra bevanda a scelta (125 ml per ogni bustina utilizzata), secondo il proprio gusto personale. La soluzione orale può anche essere assunta così com'è. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua o altra bevanda per ogni bustina utilizzata. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. Entro l'intervallo di dosi raccomandate, la dose può essere adattata alle necessità individuali, a seconda della risposta al trattamento.

A seconda delle esigenze personali, la dose giusta è la dose più bassa per produrre feci morbide e regolari. La soluzione DulcoSoft®GO è adatta per l'uso quotidiano. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

Nota bene che:
L'effetto lassativo di DulcoSoft®GO si manifesta solitamente dalle 24 alle 72 ore dopo l'ingestione.

4. Possibili effetti collaterali

DulcoSoft®GO può avere effetti collaterali. Gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi e transitori. Possono verificarsi alcuni disturbi gastrointestinali (mal di stomaco, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto collaterale dell'assunzione di dosi eccessive di DulcoSoft®GO ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione.

Sono stati segnalati rari casi di reazioni di ipersensibilità (rash cutaneo) in seguito all'uso di prodotti contenenti macrogol. Se ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglietto illustrativo, interrompa il trattamento e informi il medico o il farmacista.

5. Come conservare DulcoSoft®GO?

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

6. Ulteriori informazioni

20 ml di DulcoSoft®GO soluzione orale contengono 10 g di Macrogol 4000.
DulcoSoft®GO soluzione orale è disponibile nel formato da 20 bustine monodose.
Altri ingredienti: Acqua purificata, acido citrico, aroma limone, sorbato di potassio, benzoato di sodio, sucralosio.
Idrata e ammorbidisce le feci dure e secche. Stimola delicatamente l'evacuazione. Solievo delicato ed efficace per stitichezza e irregolarità.

Biofarma
Via Castelliere 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD)

Distribuito da:
Opella Healthcare Italy S.r.l.
Piazza Belgioioso n. 2 - IT-20121 Milano
www.dulco.it

CE0373

Dispositivo medico
Data ultima revisione: giugno 2025
(IFU1_06/25r1_11/25)



10055639

Opella.